

7. COLEOPTERA.

16. Brenthidæ

von

HILMAR V. SCHÖNFELDT.

Über Brenthiden vom Kilimandjaro ist eine spezielle Arbeit noch nicht vorliegend.

Aus Deutsch-Ost-Afrika finden sich Brenthiden in folgenden Werken: GERSTÆCKER führt in seiner Gliederthierfauna des Sansibargebietes 1873, p. 249, *Ceocephalus picipes* OLIV. an. KOLBE beschreibt in der Stettiner Entomol. Zeit. 1892, p. 168 u. ff., *Usambius Conradi*, *Microsebus pusio*, *Basenius laticornis* und ferner in »Die Käfer Deutsch-Ost-Afrikas«, Vol. 4, 1897, p. 284 u. ff. *Bolboecranus mandibularis* u. *cribriceps*, *Usambius Conradi*, *Eupsalis brevirostris*, *taruensis*, *callosoguttis*, *Spatherinus Stuhlmanni*, *Storeosomus sansibaricus*, *Paryphobrenthus Beringei*.

Aus den Ausbeuten der mit andauerndster Tätigkeit durchgeführten Expedition SJÖSTEDT in das Gebiet des Kilimandjaro stammen nachfolgende 7 Arten, welche in zusammen 87 Exemplaren vorliegen.

Zemioses poreatus PASC.

Journ. of Ent. I, p. 394. — *Meru*-Niederung, in den Akazienwäldern am Flusse Ngare na nyuki; 1 Ex.

Anisognathus distortus WESTW.

Trans. ent. Soc. V, 1849, p. 206, t. 22, f. 3. — Eine in der *Kilimandjaro*-Niederung (Obstgarten, Mischwald) und in der unteren Kulturzone häufige Art; wurde auch sparsam in den oberen Teilen der Kulturzone bei 1,800 m. angetroffen; Jan., März, Aug., Nov., Dez.; 30 Expl. — *Usambara*: Mombo, Juni.

Ionthocerus Conradi SENNA.

Deutsch. Ent. Zeit. 1898, p. 374. — *Kilimandjaro*: Kibonoto, Kulturzone, Sept.; 1 Ex.

Amorphocephalus sp.

Kilimandjaro: Kibonoto, Steppe, Okt.: 1 Ex.

Enpsalis vulsellata GYLL.

Schönh. Gen. Curcul. I, p. 325. — *Kilimandjaro*: Kibonoto, Mischwald, Nov.; 1 Ex.

Rhinopteryx foveipennis THOMS.

Arch. ent. II, 1858, p. 119. — *Kilimandjaro*: Kibonoto, von der Niederung bis an den oberen Teil der Kulturzone. März, Mai; 5 Expl.

Ceocephalus picipes OLIV.

Oliv. Ent. V, 84, p. 442, t. 2, f. 18 ♀. — Die häufigste Brenthide des Gebiets, wo sie am *Kilimandjaro* von der Steppe bis an die obere Kulturzone angetroffen wurde. Besonders war sie in der unteren Kulturzone unter der Rinde der Kandelabereuphorbien häufig; Jan., Febr., März, Mai, Nov. — Auch von Mombo in *Usambara* mitgebracht; 48 Expl.
